

人免疫球蛋白说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

传播的可能。临床使用时应权衡利弊。

【禁忌与慎用】

通用名称: 人免疫球蛋白

【规格】

300mg/瓶(10%, 3ml)

【成份】

主要成份为人免疫球蛋白。本品系由健康人血浆

【用法用量】

用法: 肌肉注射。预防接种。

由于全血输注

过敏症状, 可在与麻药局

本品每瓶(10%, 3ml)

【性状】

料。少数人会出

特殊反应, 非自行

时(30分钟内)将最大剂量

制成。本品含有少量防腐剂

【性状】

应为无色或淡黄色澄明液体, 可带乳光, 不得现

【性状】

【性状】

【性状】

尚待积累和规范不良反应的监测资

料, 尚待积累和规范不良反应的监测资

【禁忌】

于抗体与抗原相互作用起到直接中和毒素与杀灭细菌

抗A抗体的选择性IgA缺乏者

感染有一定的作用

【注意事项】

毒理研究尚不清楚

运输及贮存过程中严禁冻结

【贮藏】

【孕妇及哺乳期妇女用药】

于2~8℃避光保存和运输

未专门进行该项针对性试验研究，且无系统可靠的

【包装】

5年版三部和YBS00252013

未专门进行该项针对性试验研究，且无系统可靠的

《中国药典》202

【参考文献】

【批准文号】

53021 300mg/瓶

【药物相互作用】

国药准字S200

3020 150mg/瓶

应单独使用。凡对免疫球蛋白有相互作用的药物可

国药准字S2006

有人】

能会对本品产生相互作用。

【药品上市许可持有

博晖生物制药(河北)有限公司

【药物过量】

【生产企业】

可能产生变异反应和因剂量大在注射部位造成疼

企业名称：博晖生物制药(河北)有限公司

痛感。

生产地址：石家庄市鹿泉经济开发区青山路6号

【药理毒理】

抗体输给受者，使之

电话：0311-83935518

是把免疫球蛋白内含有的人

抗体输给受者，使之